

Adlibitumfütterung im Abferkelbereich

Jonas Koller, Hannes Odermatt und Ivan Aregger

Einleitung

Auf dem Markt dominiert die Rationsfütterung für Säugende. Seit einigen Jahren gibt es eine Alternative die Adlibitumfütterung. Man erhofft sich dadurch höhere Futteraufnahme. Deshalb sollte sich der BCS weniger verändern. Ebenfalls sollte es zu höherer Milchleistung kommen. Als Nebeneffekt lernen die Ferkel durch die Mutter schon früh feste Nahrung aufzunehmen.

Ziele

Im Versuch soll festgestellt werden, ob ein positiver Effekt im Vergleich zur Referenzgruppen festzustellen ist. In folgenden Punkten:

- BCS der More
- Gewichtszunahme der Ferkel
- Futterverzehr

Methode

- BCS Beurteilung beim Ein- und Ausstallen der Moren im Abferkelzimmer
- Wägung der Ferkel bei der Geburt und beim Absetzen
- Aufzeichnung des Futterverzehrs in kg/pro More

Versuchsanordnung

Der Versuch wird auf dem Gutsbetrieb durchgeführt. Es gibt drei Wiederholungen. Immer im gleichen Abferkelzimmer.

Jenes wird auf zwei Gruppen aufgeteilt. Buchten 1-4 Versuchsgruppe und Buchten 5-8 Referenzgruppe.

So können pro Fütterungsverfahren je zwölf Würfe miteinander verglichen.

Buchten 1-4 werden adlibitum gefüttert

Buchten 5-8 werden rationel gefüttert zwei mal am Tag

1		5
2		6
3		7
4		8

Zeitplan

August 2020	Einführung
September 2020	Abgabe Versuchsdispo
Januar 2021	Start Versuchs
Mai 2021	Ende des Versuchs
Juli 2021	Auswertung der Daten
Januar 2022	Versuchsbericht fertig



Jonas Koller
jonas98koller@gmail.com



Hannes Odermatt
odermatthannes@gmx.ch



Ivan Aregger
ivan.aregger@gmx.ch